

## Tratamiento:


Suele ser integral, personalizado y multidisciplinario (intervienen el médico, los padres, el psicólogo y el psiquiatra), debido a que en los casos más severos es necesario utilizar fármacos para disminuir la actividad cerebral de los niños.

Se recomienda un tratamiento combinado que incluya terapia conductual, medicamentos y atención psicopedagógica.

**Guía Clínica para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Organización Panamericana de la Salud y DSM IV.**




## DESCARGA Y COMPARTE



**LA VERSIÓN DIGITAL**  
CE: 234/F/059/24

**Mayor información:**  
Instituto de Seguridad Social  
del Estado de México y Municipios  
Subdirección de Salud, ISSEMYM.  
Edificio Tella, primer piso, 21 de Marzo núm. 101,  
esq. Ezequiel Ordóñez, col. La Merced,  
Toluca, Estado de México.  
☎ 722 226 19 00, exts.: 135 10 61 y 135 10 64.



# TDAH

## Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad



**OFICIALÍA MAYOR**

**issemym**

## ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)?

Es una condición neuropsiquiátrica con varias causas, da inicio en la infancia y se caracteriza por la dificultad para poner atención, hiperactividad o impulsividad que puede persistir hasta la edad adulta, impactando en diferentes áreas como la académica, laboral y social.

En la actualidad 5 de cada 100 niños pueden presentar este trastorno.

- Este trastorno es más frecuente en los niños que en las niñas.
- Entre sus consecuencias se encuentran: dificultad para socializar con otros niños, baja autoestima y bajo rendimiento escolar.
- El TDAH no se cura, solo se puede controlar.
- Es necesario que los padres y los profesores intervengan en el tratamiento, como una manera de aminorar las consecuencias.
- A menudo los niños con este trastorno suelen ser inquietos, desorganizados e impulsivos.

### Toma nota:

Algunas de las características que se presentan son:

- Falta de atención en los detalles.
- Comete errores por descuido en las tareas.
- Realiza movimientos de manos, pies y cabeza con exageración.
- No logra concentrarse en los juegos y las tareas.



- Parece no escuchar cuando se le habla directamente.
- Se le dificulta seguir instrucciones y no concluye una tarea antes de iniciar otra.
- No son de su agrado las tareas que requieren esfuerzo mental por un largo periodo (como labores del hogar y de la escuela).
- Se distrae por estímulos irrelevantes (sonidos, objetos, movimientos de su cuerpo, etcétera).